sensilis | Sensitive Skin Lab

Peptide [AR]

Nuevo abordaje de la senescencia y el inflamaging para la piel sensible

Con 6% de solución peptídica

Material destinado a profesional sanitario

ENVEJECIMIENTO CELULAR AVANZADO:

Previen

SIGNOS VISIBLES DEL ENVEJECIMIENTO[1]:



CAUSAS DEL ENVEJECIMIENTO[2]:

- **La senescencia celular:**
  Disfuncionalidad de los tejidos
- **Inflammaging:**
  Estado de inflamación crónica



Célula senescente[3]

ABORDAJE:

Nivel molecular: Objetivo detener el inflammaging.

Nivel tisular: Reforzar las estructuras de la piel.

1. López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe. Cell. 2023 Jan 19;186(2):243-278. doi: 10.1016/j.cell.2022.11.001. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36599349. 2 Zhang L, Pitcher LE, Yousefzadeh MJ, Niedernhofer LJ, Robbins PD, Zhu Y. Cellular senescence: a key therapeutic target in aging and diseases. J Clin Invest. 2022 Aug 1;132(15):e158450. 3. Aging Cell, Volume: 20, Issue: 2, First published: 01 February 2021.

Peptide, un complejo peptíd

ACTIVOS:	*EFECTO ANTISENESCEN*
Acetyl Tetrapeptide-2 (Uplevity®)	Estimula colágeno, e y LOXL1, reforzando estructura dérmica retrasando los signo envejecimiento celul
Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline® Amplified)	Disminuye señales presinápticas que ac la senescencia, ayuda preservar la juventud en todas las capas d
Acetyl SH-Hexapeptide-5 (Versillin®)	Refuerza la matriz ext y sostiene el nicho dé para evitar la propaga células senescentes.
Ornithine (Adipofill'In™)	Estimulan lipohormes rejuvenecimiento estr modulación indirecta microambiente.
Carboxymethyl Naringenin Chalcone (CM-NC)	Refuerza la unión dermoepidérmica y r degradación de colág

NO TEST,

TEST IN VITRO



4. Estudio clínico realizado en mujeres de 35 a 78 años con piel sensible seca o 20 mujeres de 35 a 65 años con piel seca, o tendencia seca, o con rosácea tipo I.

PEPTIDE [AR] de Sensilis

e y mejora los signos de envejecimiento prematuro

dico, aborda la senescencia y el inflammaging tanto a nivel molecular como tisular.

Efecto lifting con evidencia científica.

nivel molecular		*nivel tisular*	
CIA:	*EFECTO ANTIINFLAMMAGING:*	*EFECTO LIFTING:*	*EFECTO ANTIARRUGAS:*
lastina a y s de ar.	Reduce citocinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-α, ayudando a controlar la inflamación crónica asociada al envejecimiento.	Aumento de la síntesis de colágeno y elastina: mejora firmeza y contorno facial.	Contribuye a atenuar arrugas estructurales por refuerzo dérmico.
eleran ando a l celular e la piel.	Reducción del estrés oxidativo inducido por contracción repetitiva.	Tensa la piel superficialmente (efecto botox-like leve).	Reducción de la contracción muscular. Disminución de las arrugas dinámicas.
tracelular rmico ación de	Modula procesos inflamatorios vinculados al envejecimiento, reforzando la homeostasis cutánea.	Aumenta la firmeza dérmica y resiliencia tisular.	Refuerza matriz extracelular.
is y ructural, del	Reducción de mediadores inflamatorios lipotóxicos.	Estimula la lipogénesis funcional y la diferenciación de adipocitos dérmicos.	Rellena arrugas profundas por restauración del volumen dérmico.
educe la geno.	Reduce COX-2, IL-6, PGE2: Potente acción antiinflamatoria dérmica. Limita el entorno proinflamatorio asociado al SASP.	Aumento de la Integridad estructural de la unión dermoepidérmica. Soporte mecánico dérmico.	Reducción de MMPs (colagenasas). Aumento del colágeno tipo I: Prevención de arrugas por degradación de matriz.

*NO CLAIM. EFICACIA **PROAGING.***

TEST IN VIVO

Probado en piel sensible. Capacidad de rejuvenecer la tez al instante, efecto lifting para acabar con arrugas y líneas de expresión.



Imágenes tomadas con perfilometría de la piel mediante Primos 3D.



tendencia a piel seca, y con rosácea tipo I. 5. Evaluación de la capacidad de síntesis de colágeno y elastina en cultivo celular de fibroblastos humanos. 6. Estudio realizado en

EFICACIA POST TRATAMIENTO con TOXINA BOTULÍNICA[4]

Acetyl Hexapeptide-8, ayuda a prolongar el efecto de las inyecciones de toxina botulínica:

- Potencia su eficacia
- Minimiza la visibilidad de las arrugas

Este tratamiento combinado prolongó el periodo sin arrugas casi 8 semanas más que el BTA solo.





Los resultados del estudio mostraron que los participantes que recibieron el tratamiento combinado con péptidos activos presentaban un número significativamente menor de arrugas en comparación con los que recibieron BTA y un placebo.

DOS TEXTURAS

Bálsamo sorbete

Piel normal o seca

Crema sorbete

Piel mixta o grasa

PROTOCOLO PROAGING

Piel seca · Piel normal - grasa

01 | Higiene

CALM IN BALM
GENTLE CLEANSING MOUSSE

02 | Tratamiento

Según tipo de piel

Combinarlos a días alternos

PEPTIDE [AR] BÁLSAMO

PEPTIDE [AR] CREMA

ETERNALIST A.G.E. [RETINOL]

03 | Protección

PHOTOCORRECTION [AR 50+]

1. Aplicar Crema sorbete para piel normal tendencia mixta.
2. Aplicar Bálsamo sorbete para piel normal tendencia seca

SCAN ME

08/2025